

AVERTISSEMENTS

DLP 29 - B - 88036675
AGRICOLE

BULLETIN TECHNIQUE DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES RHONE-ALPES

AIN, ARDECHE, DROME, ISERE, LOIRE, RHONE, SAVOIE, HAUTE-SAVOIE

EDITION BAS-VIVARAIS

ABONNEMENT ANNUEL: 80 f

REGISSEUR RECETTES D.D.A. CCP LYON 9431-17A



Circonscription RHONE-ALPES

55, rue Mazenod 69426 LYON CEDEX 3

1er Mars 1983

N° de série continue 37

Bulletin n° 4

Le Service de la Protection des Végétaux sera présent au SALON DE L'AGRICULTURE qui se tiendra à PARIS,

Porte de Versailles, du 06 au 13 Mars 1983

Section MINISTERE DE L'AGRICULTURE - Bât. 2.2, Allée K.
Stand Direction de la Qualité N° 333.

Une information vous sera présentée sur le thème :

"Le Service de la Protection des Végétaux et le développement agricole"

- l'articulation de nos différentes missions :

Avertissements Agricoles, Expérimentation, Diagnostic en Laboratoires
Contrôles Phytosanitaires

- Pour une meilleure maîtrise des coûts de production dans la sécurité :
des moyens modernes et cohérents

L'EFFICACITÉ D'UN TRAITEMENT DÉPEND AUTANT DU PRODUIT QUE DE LA QUALITÉ DE LA PULVÉRISATION.

VÉRIFIEZ LE RÉGLAGE DE VOS APPAREILS.

ARBRES FRUITIERS

PECHER

Cloque - Les conditions de ces derniers jours sont favorables aux contaminations de ce champignon.

Nous vous rappelons que tous les vergers dont les yeux à bois sont au stade représenté par le dessin n° 2 (paru dans le Bulletin précédent) doivent être protégés.

Les dernières pluies ayant souvent lessivé l'éventuel traitement précédent, traiter dès réception tous ces vergers.

PETITS FRUITS

FRAMBOISIER

Didymella - Nous vous rappelons la nécessité de couper et brûler la totalité des rameaux atteints.

P85


FRAISIER

PROTECTION PHYTOSANITAIRE DU FRAISIER (sous tunnel plastique en Bas-Vivarais)


Les conseils proposés, ci-dessous, constituent un programme simplifié. Des cas particuliers peuvent cependant apparaître en cours de végétation ou nécessiter un diagnostic précis avant toute intervention spécifique.

Le cas échéant, il en sera fait mention dans un Bulletin en cours de saison.


EPOQUE DE TRAITEMENT (stade ci-dessous)	ENNEMIS A COMBATTRE	PRODUITS CONSEILLES
1 - STADE B-C	Pucerons Maladie des taches pourpres ...	Lindane à la dose du fabricant Manèbe ou Mancozèbe
2 - STADE D-E	Pourriture grise Pucerons Acarions	Dichlofluanide (EUPARENE 0,250 kg/hl) ou Iprodione (ROVRAL 0,150 kg/hl) ou Vinchlozoline (RONILAN 0,150 kg/hl) Aphicides homologués non dangereux pour les abeilles à la dose du fabricant : Phosalone... Acaricides homologués non dangereux pour les abeilles : Cyhéxatin, Dicofol...
3 - STADE F (pleine floraison) STADE G	Pourriture grise Pourriture grise	Dichlofluanide (EUPARENE 0,125 kg/hl) ou Iprodione (ROVRAL 0,150 kg/hl) ou Vinchlozoline (RONILAN 0,150 kg/hl) Renouvellement si conditions climatiques favorables
4 - STADE H premiers fruits verts	Pourriture grise	Mêmes produits que précédemment




pommier



poirier



pêcher



cerisier

